

## 云南普洱发现家麻雀

### House Sparrow (*Passer domesticus*) Found in Puer, Yunnan, China

2014年10月,在云南省普洱市思茅区、宁洱县等地多次发现集群的家麻雀(*Passer domesticus*),雌雄混群。雄鸟羽色与麻雀(*P. montanus*)相似,眼先、颏、喉部黑色,颊部灰白色,后颈部和颈侧栗褐色,翅上具两道淡色翼斑,下体棕白色。但家麻雀的雄鸟额部、头顶及枕部灰色,耳部无黑色斑块,上胸部黑色,与麻雀明显不同。麻雀雌、雄近同色,而家麻雀雌、雄显著异色:雌鸟头顶至后颈均为褐色,具浅棕黄色眉纹,颊部偏棕色,喉及上胸部均为棕白色。家麻雀在我国已发现有分布的省区包括黑龙江、内蒙古、陕西、甘肃、青海、新疆、西藏和四川(傅桐生等 1998,郑光美 2011),但云南未见有记录(杨岚等 2004,郑光美 2011)。家麻雀在我国已经记录到3个亚种:*P. d. domesticus*、*P. d. bactrianus*和*P. d. parkini*(傅桐生等 1998,郑光美 2011)。与我国云南省接壤的邻国缅甸、老挝也有家麻雀分布,并且是我国未曾记录过的亚种*P. d. indicus*(Robson 2005, Hoyo et al. 2009)。推测普洱地区的家麻雀很可能由缅甸、老挝扩散而来。由于在普洱市只拍摄到照片而未采集到标本,难于判别亚种,普洱地区家麻雀的亚种需要通过标本对比,甚至分子生物学等工作才能确定。由于人为引入,目前家麻雀已遍布除南极洲以外的各大洲(Hoyo et al. 2009)。家麻雀在新的栖息地大多生活在人类居住区附近,扩散能力很强。例如,家麻雀在1850年被引入到美国东部的纽约市,1910年已扩散到美国西海岸的加利福尼亚(Sibley 2001)。家麻雀在普洱市是否居留繁殖,种群数量多少尚待进一步关注。

李智宏<sup>①</sup> 徐崇华<sup>①</sup> 王宁<sup>②\*</sup>

① 云南普洱国家公园管理局 普洱 665000; ② 北京师范大学生命科学院 北京 100875

\* 通讯作者, E-mail: wangning@bnu.edu.cn;

第一作者介绍 李智宏,男,工程师;研究方向:自然保护区管理; E-mail: lzhlx@126.com。

收稿日期: 2015-06-16, 修回日期: 2015-08-20 DOI: 10.13859/j.cjz.201505020