

陕西省安康汉江发现黑腹滨鹬、角鸬鹚和斑脸海番鸭

Dunlin (*Calidris alpina*), Horned Grebe (*Podiceps auritus*) and Velvet Scoter (*Melanitta fusca*) Recorded in Ankang, Shaanxi Province

2016年11月和12月在汉江安康段进行水鸟调查时,记录到黑腹滨鹬(*Calidris alpina*)、角鸬鹚(*Podiceps auritus*)和斑脸海番鸭(*Melanitta fusca*),均为陕西省鸟类新纪录。



图1 黑腹滨鹬 (林俊礼摄)

Fig. 1 Dunlin (Photo by LIN Jun-Li)

C. a. arctica、*C. a. sakhalina* 和 *C. a. kistchinski* 4个亚种在中国东部沿海及台湾越冬(向余劲攻等 2009)。

11月26日在安康市汉滨区东提头汉江段(32°42'26"N, 109°01'44"E, 海拔314 m)观察到2只鸬鹚和骨顶鸡(*Fulica atra*)混群在江中觅食(图2)。进一步观察发现这2只鸬鹚的特征为:嘴尖而短,尖端显白,头略大,自嘴基部沿眼以上的头顶、颈后、背和翅上覆羽黑褐色;颈、喉、前颈、下体和体侧白色。经照片鉴定这2只鸬鹚为角鸬鹚,并确认其为陕西省鸟类新纪录。角鸬鹚隶属于鸬鹚目(Podicipediformes)鸬鹚科(Podicipedidae)鸬鹚属,是国家II级重点保护野生动物。在我国繁殖于新疆西北部的天山谷地(马鸣 1993),越冬于长江下游和东南沿海一带,偶尔也到台湾,迁徙时见于黑龙江、河北、辽宁、浙江、福建、香港、台湾等地(郑光美 2011)。

2016年11月24日在安康市汉滨区汉江四桥以西的沙滩处(32°42'37"N, 109°02'05"E)发现一只滨鹬(图1)。拍照后用单筒望远镜(Zeiss 85T* FL 20-60X)观察,其主要特征为:嘴长而略弯,黑色,眉纹白色,颈侧和胸具褐色细纵纹,腹白色有零星黑斑,头顶、后颈、背、肩和翅上覆羽淡灰褐色,翅上覆羽具白色羽缘;中央尾羽黑褐色,两侧尾羽灰色有明显白色羽缘。经查阅相关文献,认定该物种为黑腹滨鹬(约翰·马敬能等 2000, 赵正阶 2001),并确认其为陕西省鸟类新纪录(冯宁 2008, 郑光美 2011)。黑腹滨鹬隶属于鸬鹚目(Charadriiformes)鸬鹚科(Scolopacidae)滨鹬属,目前认为有10个亚种(van Gils et al. 2017),其中



图2 角鸬鹚 (林俊礼摄)

Fig. 2 Horned Grebe (Photo by LIN Jun-Li)

基金项目 国家林业局野生动物资源调查鸟类秋季同步调查项目;

* 通讯作者, E-mail: yuxp64@163.com;

第一作者介绍 董荣,男,博士研究生;研究方向:保护生物学与恢复生态学;E-mail: donglitttle@sohu.com。

收稿日期:2017-01-10, 修回日期:2017-03-30 DOI: 10.13859/j.cjz.201703027




图 3 斑脸海番鸭 (林俊礼摄)

Fig. 3 Velvet Scoter (Photo by LIN Jun-Li)

(Carboneras et al. 2017), 国内仅在新疆哈纳斯有一次繁殖记录(周永恒 1989), 为中国东部沿海省份罕见冬候鸟, 迁徙时见于辽宁大连、丹东、黑龙江哈尔滨、安徽芜湖、内蒙呼伦贝尔盟(韩晓东等 1989)、北京、河北北戴河(刘阳等 2005)、秦皇岛、四川南充等地。本次在安康汉江段的水鸟调查, 除记录到上述 3 种水鸟外, 还记录到红胸秋沙鸭(*Mergus serrator*)、长尾鸭(*Clangula hyemalis*)等其他雁鸭类, 陕西汉江段是陕西省雁鸭类和鸕鹚类重要的越冬地和迁徙停歇地, 黑腹滨鹚、角鹬和斑脸海番鸭出现在我国中西部陕西汉江安康段较为罕见, 将为研究陕西水鸟迁徙提供基础资料。

12 月 1 日在安康汉滨区汉江四桥西边的汉江段(32°42'34"N, 109°02'28"E)观察到 2 只海番鸭与凤头潜鸭(*Aythya fuligula*)混群在江面觅食(图 3)。这 2 只海番鸭的主要形态特征为: 嘴扁平呈灰黑色, 其中一只通体为黑色, 额、头顶、颊、喉和前颈棕黑色, 眼下及眼后有白色点块斑, 次级飞羽有白色翼镜。另一只通体为烟褐色, 眼和嘴之间及耳羽上各有一白色点块斑。经查阅相关文献, 认定这 2 只海番鸭分别为斑脸海番鸭雄性和雌性个体, 并确认该物种为陕西省鸟类新纪录。斑脸海番鸭隶属于雁形目(Anseriformes)鸭科(Anatidae)海番鸭属, 易危(VU)(IUCN 2015)。国外繁殖于斯堪的纳维亚和爱沙尼亚东部到俄罗斯的叶尼塞河, 西伯利亚南部到哈萨克斯坦

董荣^① 曹强^② 林俊礼^③ 于晓平^{①*}

① 陕西师范大学生命科学学院 西安 710119; ② 陕西大自然课堂 西安 710000;

③ 安康市汉滨区同鸣汉江水鸟保护中心 安康 725000