

西藏达孜县发现灰椋鸟

White-cheeked Starling (*Sturnus cineraceus*) Found in Dagze, Tibet

2016年12月29日,在拉萨河沿岸的达孜县唐嘎乡湿地(29°50'12.68"N, 91°33'31.74"E,海拔3760 m)发现11只体型中等(体长约22~25 cm)的灰色椋鸟。其头黑,头侧具有白色纵纹,喙黄色,尖端黑色,跗跖和趾为暗橘黄色,腹部比背部灰色略浅,臀部偏白(图1)。经鉴定,该鸟为雀形目(Passeriforms)椋鸟科(Sturnidae)的灰椋鸟(*Sturnus cineraceus*)。发现时这些鸟和紫翅椋鸟(*S. vulgaris*)混群在拉萨河畔农田附近的草甸草原活动,周围还有斑头雁(*Anser indicus*)、赤麻鸭(*Tadorna ferruginea*)、凤头麦鸡(*Vanellus vanellus*)等鸟类。



图1 灰椋鸟

Fig. 1 *Sturnus cineraceus*

经查阅相关文献(中国科学院青藏高原综合科学考察队 1983,刘迺发等 2013,郑光美 2017),其在国外主要分布区包括西伯利亚、日本、菲律宾、越南北部和缅甸北部,国内繁殖于华北、东北等地,冬季迁徙至中国南方,在青藏高原北部的甘肃天祝、青海西宁等地作为夏候鸟出现,但无该物种在西藏分布的确切记录。中国鸟类记录中心有1笔sheen于2010年2月14日在西藏拉萨西郊罗布林卡记录到灰椋鸟6只的观鸟记录。本次发现在其基础上进一步证实了灰椋鸟在西藏的分布,推测拉萨及周边温暖的河谷地带或为灰椋鸟的越冬分布区。

致谢 感谢北京师范大学阙品甲博士在物种分布资料搜集方面的帮助。

杨乐^① 周生灵^① 李继荣^② 魏聪^① 土艳丽^①

① 西藏自治区高原生物研究所 拉萨 850000; ② 西藏自治区农牧科学院农业质量标准与检测研究所 拉萨 850000

基金项目 西藏自治区重大专项子课题(No. 2015XZ01G7205),生态环境部生物多样性保护专项;

第一作者介绍 杨乐,男,副研究员;研究方向:青藏高原动物生态学;E-mail: yangletibet@126.com。

收稿日期: 2017-10-24, 修回日期: 2018-01-20 DOI: 10.13859/j.cjz.201803020