

宁夏六盘山发现斑背噪鹛

New Distribution of *Garrulax lunulatus* in Liupan Mountain National Nature Reserve, Ningxia Hui Autonomous Region, China

2016年7月至9月在宁夏回族自治区固原市六盘山国家级自然保护区(35°15'~35°41'N, 106°09'~106°30'E, 海拔1700~2600 m)利用红外相机(Ltl-6210)在红峡林场、卧羊川林场和东山坡林场4次(7月19日、7月27日、8月4日、9月26日)拍摄到同一种鸟(图1)。这种鸟体型略小,有明显的白色眼圈,上体暖褐色,两胁具草黄色鳞状斑纹,初级飞羽及外侧尾羽的羽缘蓝灰色,尾端白色。经查阅相关文献(赵正阶 2001, 郭冬生等 2015, 郑光美 2017),确认该鸟为雀形目(Passeriformes)噪鹛科(Leiothrichidae)的斑背噪鹛(*Garrulax lunulatus*)。



图1 斑背噪鹛

Fig. 1 *Garrulax lunulatus*

斑背噪鹛为中国特有种,分布于陕西南部、甘肃南部、四川、重庆、湖北西部(郑光美 2017),主要栖息于海拔1400~2600 m的高山针叶林、针阔混交林、亚热带常绿阔叶林和竹林中,也出现于林缘疏林灌丛、次生林和地边灌丛中,常成对或单独活动,较少成群,多在林下灌丛和地上活动(赵正阶 2001, 郭冬生等 2015);在繁殖季节也有结群活动的现象,有时和橙翅噪鹛(*G. elliotii*)等结成4~10只左右的群活动(王世国等 1984)。经查阅相关资料(郑光美 2017),均未见该物种在宁夏回族自治区分布的相关记录。此次记录斑背噪鹛为宁夏回族自治区鸟类分布新发现。

六盘山国家级自然保护区所处地理位置与斑背噪鹛分布的北界陕西南部秦岭至甘肃南部白水江地区相距约440 km(谷歌地图),其间有小陇山国家级自然保护区、鸡峰山省级自然保护区、太白山国家级自然保护区、太统-崆峒山国家级自然保护区等森林连接,且六盘山和这些保护区均分布有针叶林、针阔混交林、常绿落叶阔叶混交林、灌丛和次生林等适宜斑背噪鹛生存的生境类型,亦可能有斑背噪鹛的分布,具体情况有待于进一步调查证实。此次发现将为该濒危鸟类的保护提供基础资料。

致谢 感谢六盘山国家级自然保护区管理局的大力支持和各林场工作人员在外业工作中的帮助。

祝招玲^{①②} 高惠^① 滕丽微^③ 韦锦云^① 朱泽宇^① 姚绪新^① 何静^① 李宗智^① 刘振生^{①③*}

① 东北林业大学野生动物资源学院 哈尔滨 150040; ② 佳木斯大学旅游管理学院 佳木斯 154007;

③ 国家林业局野生动物保护学重点开放实验室 哈尔滨 150040

基金项目 中央高校基本科研业务费项目(No. 2572014CA03), 国家自然科学基金项目(No. 31372221);

* 通讯作者, E-mail: zhenshengliu@163.net;

第一作者介绍 祝招玲,女,博士研究生;研究方向:野生动物生态学,生态旅游;E-mail: zhuzhaoling11@163.com。

收稿日期: 2018-06-04, 修回日期: 2018-07-30 DOI: 10.13859/j.cjz.201805027