

## 湖北神农架发现白眉蓝姬鹩

### Ultramarine Flycatcher (*Ficedula superciliaris*) Found in Shennongjia, Hubei Province, China

2019年6月8日,在湖北省神农架林区209国道天燕观景台(31°43'02" N, 110°27'14" E, 海拔1790 m)观察到附近峡谷中有1只雄性白眉蓝姬鹩(*Ficedula superciliaris*)在锐齿槲栎(*Quercus aliena* var. *acuteserrata*)树枝上跳跃、停留,并拍摄到此鸟的清晰照片(图1)。白眉蓝姬鹩主要以昆虫为食,野外识别特征为雄鸟无白色眉纹或眉纹不明显,喉侧、颈侧为深蓝色,胸部两侧各有较大的深蓝色斑,于胸部几乎汇合形成一环带,上体深蓝色,下体白色;雌鸟眼圈白色,头顶和头侧呈沙褐色,上体橄榄灰色,下体灰白色。白眉蓝姬鹩常单独或成对活动,繁殖期多栖息于常绿阔叶林、竹林和针阔叶混交林中;非繁殖期多活动于低山和山脚平地带的林缘疏林中,有时也出现在果园和农耕地附近的丛林中(赵正阶 2001, 段正科等 2015)。经查阅相关资料(约翰·马敬能等 2000, 赵正阶 2001, 段正科等 2015, 郑光美 2017),尚无该物种在湖北地区分布的记录,本记录是白眉蓝姬鹩在湖北省分布的首次正式报道。

白眉蓝姬鹩隶属雀形目(Passeriformes)鹩科(Muscicapidae),共有2个亚种,即指名亚种*F. s. superciliaris*和亚种*F. s. aestigma*,国内仅分布有*aestigma*亚种。指名亚种分布于阿富汗、喜马拉雅山脉、印度、缅甸和泰国。*aestigma*亚种见于我国的西藏东南部、云南西部、四川和广西中部(郑光美 2017)。此次在湖北的记录应为*aestigma*亚种。



图1 白眉蓝姬鹩(雄性)(陈光海摄)  
Fig. 1 Ultramarine Flycatcher (*Ficedula superciliaris*) (male)  
(Photo by CHEN Guang-Hai)

喻珺頔<sup>①</sup> 陈光海<sup>②</sup> 吴楠<sup>③④</sup> 喻杰<sup>⑤</sup> 周友兵<sup>⑥\*</sup>

① 济南大学商学院 济南 250000; ② 湖北神农架林区红坪镇人民政府 神农架 442400;

③ 中国科学院植物研究所, 植被与环境变化国家重点实验室 北京 100093; ④ 中国科学院大学 北京 100049;

⑤ 湖北神农架林区农业资源区划委员会办公室 神农架 442400; ⑥ 三峡大学生物与制药学院 宜昌 443002

基金项目 国家自然科学基金项目(No. 31500359);

\* 通讯作者, E-mail: zhouyb@ibcas.ac.cn;

第一作者介绍 喻珺頔, 女, 本科生; 研究方向: 生态旅游管理; E-mail: 313293030@qq.com。

收稿日期: 2019-08-13, 修回日期: 2019-09-23 DOI: 10.13859/j.cjz.202003020