

苍头燕雀在内蒙古的发现*

张文广

(内蒙古乌盟地病站)

赵国钦

(包头市环境监测站)

苍头燕雀 (*Fringilla coelebs*) 主要分布于欧洲、非洲北部、中亚和伊朗北部等地，是一种典型森林鸟类，在我国极少见到。1986 年我们在内蒙古中部九峰山先后两次扑到该鸟(雌、雄

各一只)。

九峰山位于内蒙古中部，系大青山的主峰。

* 承内蒙古师范大学凤凌飞副教授鉴定标本，谨此致谢。

海拔 2358 米, 地居东经 $110^{\circ}48'$ 、北纬 $40^{\circ}34'$ 。1986 年 4 月 20 日, 在九峰山南麓(海拔 1030 米)果园内高大的杨树冠上, 见到一群燕雀 (*F. montifringilla*) 啄食, 其中有几只与众不同, 击中一只雌性苍头燕雀, 余者皆惊飞。4 月 27 日又在同一地区见到它们和普通燕雀混群取食, 又击落一只雄性苍头燕雀。此后虽然连续多次在该地搜寻, 再未见其踪迹。前后在该地停留约一周时间。

苍头燕雀的主要特征是: 雄鸟(繁殖羽)额为黑色, 头蓝石板灰色, 背部肉桂色, 腰及尾上

复羽绿色; 下体红褐沾葡萄红色, 胸部比较鲜亮, 二外侧尾羽具大型白色斑。

苍头燕雀和普通燕雀的主要区别在于腰和二外侧尾羽:

腰白色、二外侧尾羽的内翈无白斑者为普通燕雀。腰淡黄绿色、二外侧尾羽的内翈具大型白斑者为苍头燕雀。

苍头燕雀这次在内蒙古中部的发现, 是其在内蒙古的新纪录, 也是解放后在我国的第二次发现。两次采到该鸟的季节都是春季北迁之时。