

# 斑头鸺鹠在泰山等地为留鸟\*

杜 恒 勤

(山东省林业学校)

文献记载,斑头鸺鹠 (*Glaucidium cuculoides*) 在国内分布区是:长江以南各省,西达云南西北部、四川雅安及西南部会东,北至河南南部、陕西南部及甘肃南部武山(鸺);偶见于山东潍县(郑作新 1976)。笔者 1982—1985 年进行泰山鸟类调查时,1982 和 1983 年的 11 月下

旬,于黄昏时刻,多次观察到斑头鸺鹠停站在青年路五金交电站的楼顶和林业学校水塔顶等处,夜间并闻其 hooloo-hooloo 的叫声。1982  
(下转第51页)

---

\* 本文曾登在本刊 1988 年第 2 期,因故使版位移动,发生错位,致与原文出入较大。为此,重将此文刊载,并向作者、读者致歉。——编者

(上接第53页)

年2月,1只斑头鹁鹑进入鸡舍内,经剖胃检析,全是鞘翅目昆虫碎片。1985年5月15日,在泰山观察一窝孵卵的斑头鹁鹑,巢是在距地1.1米的石洞内,有卵三枚。1986年4月24日至6月5日,在徂徕山观察一窝繁殖的斑头鹁鹑,其巢是在大口井壁的洞内,是强占的白鹡鹑(*Motacilla alba*)的筑巢处所,产有四枚卵。笔者经过几年的调查,斑头鹁鹑在泰山、徂徕山,是一年四季都能见到的鸟类。

据山东省惠民地区林业局进行鸟类普查时获得的资料,斑头鹁鹑在惠民地区亦是留鸟。惠民地区地处鲁北黄河下游,位于东经 $117^{\circ}15'$ — $118^{\circ}22'$ 、北纬 $36^{\circ}41'$ — $38^{\circ}16'$ 。而泰山处于山

东半岛西部,鲁中南山区。位于东经 $117^{\circ}5'$ — $117^{\circ}24'$ 、北纬 $36^{\circ}5'$ — $36^{\circ}75'$ 。徂徕山位于东经 $117^{\circ}16'$ — $117^{\circ}20'$ 、北纬 $36^{\circ}02'$ — $36^{\circ}07'$ 。泰山、徂徕山与惠民地区所处经纬度相近,但在山东省的地理区划上,泰山、徂徕山位于黄河之南,属鲁中南山区一部分,惠民地区在黄河之北,为鲁西北平原的一部分,两地的地理位置、生境,在山东省有一定典型性。

上述可知,斑头鹁鹑在山东一些地区,是四季留居的鸟类。留居的生境有山区和平原,其范围是东经 $117^{\circ}5'$ — $118^{\circ}22'$ 、北纬 $36^{\circ}5'$ — $38^{\circ}16'$ 。