

山东日照发现王锦蛇

张守富^① 张守贵^②

(^①山东省日照市林业局; ^②日照市东港区涛雒镇林业站 山东 日照 276800)

关键词: 王锦蛇; 山东; 日照

中图分类号: Q958 文献标识码: A 文章编号: 0250-3263(2002)06-72-01

Discovery of *Elaphe carinata* in Rizhao, Shandong Province

ZHANG Shou-Fu ZHANG Shou-Gui

(^① Forestry Bureau of Rizhao City; ^② Forestry Station of Taolu Township Donggang District of Rizhao City Rizhao, Shandong 276800, China)

Key words: *Elaphe carinata*; Shandong; Rizhao

2001年9月8日,在山东省日照市莒县店子集镇范家石槽村发现一条王锦蛇 *Elaphe carinata* (Guenther),其特征为:长约2 m,重约3 kg,粗在体中段的直径约5 cm。体背棕黑、黄色相杂,略呈网纹。腹鳞宽阔;背鳞不扩大,具强棱;吻端齐,不成锥状;头部椭圆形,头背大鳞平滑;颞鳞正常,不起棱;颊鳞1枚;鼻间鳞及前额鳞均各1对;吻鳞在背面仅见其上缘;眶后鳞2枚。头的背面的鳞缘及鳞沟黑色成“王”字形。

日照市位于鲁东南黄海之滨,地处东经118°35'~119°39',北纬35°04'~36°21'之间,属暖温带湿润季风区大陆性气候,年平均气温12.7℃,极端最低气温-14.5℃,极端最高气温38.3℃,年平均降水量841 mm。范家石槽地处沭河平原,王锦蛇被发现时盘卧于村内民宅旁的沙堆上。

资料记载,王锦蛇分布于我国南方,见于河南、陕

西、甘肃、四川、云南、贵州、湖北、安徽、江苏、浙江、江西、福建、台湾、广东、广西^[1],1987年高武报道该蛇在北京亦有分布^[2]。在北京和江淮之间始终是王锦蛇分布空白区,这次发现填补了这一空白。

据调查,日照市的乔子山、磴山也有王锦蛇分布,但数量极为稀少,很难见到。在野外王锦蛇可捕食黑眉蝮(*Agkistrodon saxatilis*)和赤链蛇(*Dinodon rufozonatum*)等蛇类。

参 考 文 献

- [1] 田婉淑等. 中国两栖爬行动物鉴定手册. 北京: 科学出版社, 1986.
- [2] 高武. 北京蛇类新记录——王锦蛇. 两栖爬行动物学报, 1987.

第一作者介绍 张守富,林业工程师;长期从事野生动物调查研究。

收稿日期:2002-01-20,修回日期:2002-09-30