

# 世界猪的种类、分布和现状

猪年伊始,让我们了解一下猪家族。Pavlinov(2003)将世界猪类归入偶蹄目(Artiodactyla)猪形亚目(Suiformes),包括猪科(Suidae)和西獠科(Tayassuidae)2个现代科及15个化石科。依Wilson和Reeder(2005),猪科包括5属19种,西獠科包括3属3种,共计8属22种,其中不乏一些受到威胁的濒危物种。详细种类见下表:

物种	分布	濒危等级
<b>猪科 Suidae</b>		
布鲁鹿豚 <i>Babyrusa babyrussa</i>	印度尼西亚摩鹿加群岛(Molucca)中的布鲁岛(Buru)和苏拉群岛(Sula)	CITES 附录 I, IUCN 易危级(VU)
波拉巴图鹿豚 <i>B. bolabatuensis</i> <sup>1</sup>	印度尼西亚苏拉威西岛南部	
北苏拉威西鹿豚 <i>B. celebensis</i> <sup>1</sup>	印度尼西亚苏拉威西岛北部	
马兰格鹿豚 <i>B. togeanensis</i> <sup>1</sup>	印度尼西亚马兰格岛(Malenge)	
大林猪 <i>Hylochoerus meinertzhageni</i>	非洲西部、中部和东部的几内亚、科特迪瓦、加纳、喀麦隆、中非、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、加蓬、肯尼亚、尼日利亚、刚果、卢旺达、苏丹和乌干达	<i>ivorienis</i> 亚种为 IUCN 易危级,其他为无危级(曾翻译为低危/需予关注,LR/lc)
沙漠疣猪 <i>Phacochoerus aethiopicus</i>	非洲东北部的埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里	指名亚种已经绝灭, <i>delamerei</i> 亚种为 IUCN 易危级,其他为无危级
普通疣猪 <i>P. africanus</i>	除雨林和沙漠腹地之外的绝大部分非洲大陆	<i>aeliani</i> 亚种为 IUCN 濒危级(EN),其他为无危级
丛林猪(假面野猪) <i>Potamochoerus larvatus</i>	非洲东部、中部和南部	IUCN 无危级
红河猪(非洲野猪) <i>P. porcus</i>	非洲西部和中部的雨林地区	IUCN 无危级
巴拉望野猪 <i>Sus ahoenobarbus</i>	菲律宾巴拉望岛(Palawan)、巴拉巴克岛(Balabac)和卡拉棉岛(Calamian)	IUCN 无危级
须野猪 <i>S. barbatus</i>	文莱、印度尼西亚(邦加岛、加里曼丹岛、苏门答腊岛)和马来西亚(沙捞越)	IUCN 无危级
大嘴野猪 <i>S. bucculentus</i>	越南和老挝	IUCN 评估为数据缺乏(DD)
卷毛野猪 <i>S. cebifrons</i> <sup>2</sup>	菲律宾	指名亚种已绝灭,其他亚种为极危级(CR)
印尼野猪 <i>S. celebensis</i>	印度尼西亚苏拉威西和邻近岛屿	IUCN 无危级
欧氏野猪 <i>S. oliveri</i> <sup>3</sup>	菲律宾的民都洛岛(Mindoro)	
菲律宾野猪 <i>S. philippensis</i>	菲律宾诸多岛屿	IUCN 易危级
倭野猪 <i>S. salvanius</i> <sup>2</sup>	不丹、尼泊尔南部、印度北部(包括锡金)	CITES 附录 I、IUCN 极危级
野猪 <i>S. scrofa</i>	广泛分布于北非、欧洲、亚洲、澳洲、美洲等地,有的属于后来引进的种群	<i>riukiuanus</i> 亚种为 IUCN 易危级,其他为无危级
爪哇野猪(多疣野猪) <i>S. verrucosus</i>	印度尼西亚爪哇岛、马杜拉岛(Madoera)巴维岛(Bawean)	IUCN 濒危级
<b>西獠科 Tayassuidae</b>		
草原西獠 <i>Catagonus wagneri</i>	阿根廷、玻利维亚、巴拉圭	IUCN 濒危级
中美西獠 <i>Pecari tajacu</i>	美国(亚利桑那州和德克萨斯州)、墨西哥、中美洲、南美洲北部和中部	CITES 附录 II, IUCN 无危级
白唇西獠 <i>Tayassu pecari</i>	墨西哥、中美洲、南美洲北部和中部	CITES 附录 II, IUCN 无危级

1. 此3种鹿豚是在2001年从布鲁鹿豚的亚种提升的新种,IUCN尚未对这3种鹿豚做出评估 2. 世界上最濒危的野猪之一 3. 曾经认为是菲律宾野猪的亚种,2001年提升为种。