

## 河南南阳发现红颈瓣蹼鹬

### Red-necked Phalarope (*Phalaropus lobatus*) Found in Henan Baihe National Urban Wetland Park

2014年8月29日,在河南南阳市白河国家城市湿地公园第四橡胶坝下(32°57'10.05"N, 112°30'19.15"E,海拔116 m)发现2只鹬类。通过查阅有关文献(约翰·马敬能等2000,郑光美2011)对照片和视频资料仔细辨认,鉴定为鸻形目(Charadriiformes)鹬科(Scolopacidae)红颈瓣蹼鹬(*Phalaropus lobatus*),为该种在河南省首次发现。

形态特征: 头顶、后颈及背灰黑色,具有白色眉纹和灰黑色贯眼纹,颊及喉白色。背灰黑色,具有白色羽缘;背部和肩部4条淡橙黄色纵走带斑,其后于腰部回合呈“V”字形;胸侧及肋部具灰色斑纹。嘴黑色,脚灰色(图1)。

红颈瓣蹼鹬在国内分布于黑龙江、吉林、辽宁、河北、北京、天津、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、香港、澳门、海南、台湾、云南、湖南、新疆、青海、四川、江西(钟平华等2009,郑光美2011,廖颖等2012)。此次发现进一步扩展了该种的分布范围。非常巧合的是笔者于2013年9月25日在同一地点附近拍到灰瓣蹼鹬(*Phalaropus fulicarius*),也为该种在河南省首次发现(梁子安等2014)。



图1 红颈瓣蹼鹬背面(a)、头部(b)及侧面(c)

Fig. 1 Dorsal (a), head (b) and lateral (c) of *Phalaropus lobatus*

韩雪梅<sup>①</sup> 梁子安<sup>①\*</sup> 王庆合<sup>②</sup> 闫光兰<sup>①</sup>

① 南阳师范学院生命科学与技术学院 南阳 473061; ② 南阳市野生动植物保护站 南阳 473000

\* 通讯作者, E-mail: liangzian1965@163.com;

第一作者介绍 韩雪梅,女,讲师;研究方向:动物生态学;E-mail: hanxuemei916@163.com。

收稿日期: 2015-04-08, 修回日期: 2015-06-23 DOI: 10.13859/j.cjz.201504020