

黑龙江省嫩江发现灰眉岩鹀

Godlewski's Bunting (*Emberiza godlewskii*) Found in Nenjiang, Heilongjiang Province

2015年10月31日在黑龙江省嫩江县高峰林场水库环志点(49°05'31"N, 125°15'12"E, 海拔297 m)捕到1只眉纹、颊、耳羽、喉和上胸均呈蓝灰色的鹀类小鸟, 经查阅相关文献, 鉴定为灰眉岩鹀北方亚种(*Emberiza*



图1 灰眉岩鹀 Godlewski's Bunting

godlewskii omissa) 雄鸟。该鸟体重 28.6 g, 全长 168 mm, 头喙 30 mm, 嘴峰 11 mm, 翼长 80 mm, 尾长 80 mm, 跗跖 20 mm (图 1)。经查阅《黑龙江省鸟类志》、《黑龙江省脊椎动物检索》及相关文献, 确定为黑龙江省鸟类新纪录。捕获该鸟的生境为森林与草本沼泽湿地、水库的交汇处。工作人员测量、环志、拍照后, 将该鸟于原地放飞。

灰眉岩鹀在国内分布于辽宁西部、河北西北部、北京、山西、陕西南部、内蒙古东南部、甘肃南部、宁夏、四川、重庆、贵州、湖北西部等省区(郑光美 2011)。赵正阶(2001)将其归结为华北亚种 *E.g. omissa*, 并认为该亚种不分布于国外。

方思远 李显达* 方克艰 吴 军 刘志鹏

黑龙江高峰鸟类环志站 嫩江 161407

基金项目 国家林业局、全国鸟类环志中心环志专项经费;

* 通讯作者, E-mail: njgflxd@126.com;

第一作者介绍 方思远, 男, 学士; 研究方向: 鸟类生态学; E-mail: 434379512@qq.com。

收稿日期: 2016-01-28, 修回日期: 2016-03-22 DOI: 10.13859/j.cjz.201604026