

- [ 6 ] 王中裕,李晓华,郑晓斌,等.朱鹮觅食地的生态观察.生态学杂志,1985,4(2):10-12
- [ 7 ] 史东仇,于晓平,路宝忠,等.朱鹮的食性资料和游荡期的食物丰度.西北大学学报,1991,21(增刊):37-42
- [ 8 ] 宁陕县地方志编撰委员会.宁陕县志.西安:陕西人民出版社,1992,55-67.
- [ 9 ] Safran B, Cowell M A, Isola, C R, et al Foraging site selection by non-breeding white-faced ibis Condor, 2000, 102: 211 - 215.

## 江苏省发现黑冠鸛隼、白胸翡翠

2006年5月5日,笔者在南京市浦口区老山林场狮子岭分场(约119°04'17"E, 32°14'52"N)发现黑冠鸛隼(*Aviceda leuphotes*)。2008年5月17日在南京市东郊紫金山拍到照片。该鸟通体黑白色,头部黑色的长冠羽十分明显;胸部具有黑色和栗色的横纹,可以确定为黑冠鸛隼南方亚种(*A. l. siana*)。2008年9月30日再次在紫金山发现(图1a)(2007年5月12日范明摄于南京紫金山)。

2006年9月9日,笔者在南京市浦口六合区龙袍镇滁河入长江口湿地(约118°37'23"E, 32°07'15"N)发现白胸翡翠(*Halcyon smyrnensis*),并拍摄了照片。该鸟背蓝色;颈、喉、胸部白色;嘴、脚赤红色。2008年10月4日在南京市浦口区江浦境内沿江湿地再次发现该鸟种(图1b)(2008年10月4日沈强摄于南京)。

根据《中国鸟类分类与分布名录》(郑光美,2005)及其他相关资料,凤头鹰在我国主要分布在云南、贵州、四川、湖北、江西、广东、广西、海南等地,属留鸟。黑冠鸛隼在我国主要分布云南、贵州、湖北、江西、浙江、广东、广西等地,属留鸟。白胸翡翠在我国主要分布于四川西南部、贵州、云南、湖北、江西、浙江、广西、广东、福建、海南等地,属留鸟。此3种鸟类在南京地区的发现是江苏省首次记录。



图1 黑冠鸛隼(a)、白胸翡翠(b)

鲁长虎 雷 铭 张 宇

( 南京林业大学 南京 210037; 江苏野鸟会 南京 210018)