

## 中国鸟类新记录种——黑腰滨鹬

### A New Bird Record in China: Baird's Sandpiper *Calidris bairdii*

2022年9月12日,在浙江省温州市龙港市海滨(27°32'39" N 120°38'10" E,海拔约3 m)观察到1只小型滨鹬(图1),其体型明显大于附近活动的红颈滨鹬(*Calidris ruficollis*),与阔嘴鹬(*C. falcinellus*)相当。该滨鹬头部至颈部以及胸部皮黄色,密布灰褐色纵纹,上体其余部分大都灰褐色,背部及肩羽具黑褐色斑,振翅时可见黑褐色的中央尾上覆羽及尾羽;喉白色,腹部及尾下覆羽白色。喙黑色,细长而尖;跗跖及脚黑色。与国内已有分布的滨鹬均有明显差异。查阅 *Shorebirds of the Northern Hemisphere* (Chandler 2009)、*National Geographic Complete Birds of North America* (3<sup>rd</sup> ed, Alderfer et al. 2021) 等资料后,鉴定该鸟为黑腰滨鹬(*C. bairdii*)。当日14时,该鸟飞离,此后再未发现其踪迹。



图1 黑腰滨鹬(2022年9月12日摄于龙港)

Fig. 1 *Calidris bairdii* (Photo at Longgang on 12<sup>th</sup> September 2022)

a. 黑腰滨鹬(左)和阔嘴鹬(右)体型相似; b. 黑腰滨鹬。a. *C. bairdii* (left) and *C. falcinellus* (right) have similar body shape; b. *C. bairdii*.

黑腰滨鹬隶属于鸻形目(Charadriiformes)鹬科(Scolopacidae),是一种中小型滨鹬,主要栖息于苔原及低草地,迁徙时多活动于淡水水体的岸边。在北美洲的加拿大北部及阿拉斯加等地繁殖;越冬于南美洲中南部的中高海拔地区。黑腰滨鹬有很强的飞行能力,在亚洲、欧洲、非洲及大洋洲多地有迷鸟记录(Chandler 2009, Redman 2011, Badley et al. 2017)。查阅《中国鸟类分类与分布名录》(3版)(郑光美 2017)、《中国观鸟年报-中国鸟类名录9.0》(中国观鸟年报编辑部 2021)等文献资料,也均未发现该鸟在中国境内的分布记录,确认此次发现的黑腰滨鹬为中国新记录种。

严志文<sup>①②③</sup> 王翠<sup>②④</sup> 钱程<sup>①②③</sup> 方明和<sup>②⑤</sup> 范忠勇<sup>①②③⑥\*</sup>

① 杭州市鸟类生态与研究学会 杭州 310014; ② 浙江省野生动植物保护协会野鸟分会 杭州 310014;

③ 浙江自然博物院 杭州 310014; ④ 杭州原乡野地生态保护与研究中心 杭州 310030;

⑤ 温州市绿眼睛生态保护中心 苍南 325800; ⑥ 浙江生物多样性研究中心 杭州 310014

\* 通讯作者, E-mail: fanzy@zmnh.com;

第一作者介绍 严志文,男,研究助理;研究方向:鸟类生态学; E-mail: iandrosace@126.com。

收稿日期: 2023-03-28, 修回日期: 2023-08-12 DOI: 10.13859/j.cjz.202305017