

江苏江阴发现小黄脚鹬

Lesser Yellowlegs (*Tringa flavipes*) found in Jiangyin, Jiangsu, China

2024年4月10日,在江苏省江阴市顾山镇赤岸村藕塘(121°27'29" E, 32°16'7" N)观察并用相机拍摄到1只与林鹬(*Tringa glareola*)、大滨鹬(*Calidris tenuirostris*)等混群的鹬类(图1)。该鸟体型中等,头部有白色短小的眉纹;背部夹杂黑色、褐色斑纹,具白色斑点;胸部有粗且明显的纵纹;喙呈深色较长且直、喙基部黄褐色;跗跖为显著的黄色。飞行时翼尖(初级飞羽)超出尾端,腰部白色呈方形,据此特征并查阅《中国鸟类野外手册》(约翰·马敬能等 2022)和《中国鸟类观察手册》(刘阳等 2021)图鉴比对,确定此个体为小黄脚鹬(*T. flavipes*)。小黄脚鹬与形态相似的林鹬区别在于头部眉纹更短小,胸口纵纹更粗,跗跖较林鹬的更长且颜色更黄;与红脚鹬(*T. totanus*)相比,除跗跖颜色有区别外,飞行时翅后缘无白色,腰部白色呈方形,而非楔形;经查询 *Complete Birds of North America* (2nd ed, Alderfer et al. 2014), 鹤鹬(*T. erythropus*)体长 32 cm, 大黄脚鹬体长 36 cm, 大黄脚鹬较鹤鹬体型更大,而根据图 2, 本次观察到的鹬体型较鹤鹬更小, 故排除其为大黄脚鹬(*T. melanoleuca*)。

小黄脚鹬主要在北美地区繁殖,越冬至美国南部、墨西哥及中南美洲,近年来种群数量呈下降趋势(Christie et al. 2023), 澳大利亚、日本及印度尼西亚等地有过记录,我国境内仅在台湾和香港有过记录(郑光美 2023), 同时查询 eBird (www.ebird.org) 和中国观鸟记录中心 (http://www.birdreport.cn) 数据, 确定小黄脚鹬为我国江苏首次正式记录。其居留型有待进一步观察。



图 1 飞行状态的小黄脚鹬(钱锋摄)



图 2 小黄脚鹬(右)与鹤鹬(左)

Fig. 1 Lesser Yellowlegs (*Tringa flavipes*) in flight (Photo by QIAN Feng) Fig. 2 Lesser Yellowlegs (*Tringa flavipes*) (right) and Spotted Redshank (*T. erythropus*) (left)

致谢 感谢章麟、许明岗、苏涛、史杰和曹叶源五位先生在物种鉴定及资料收集方面给予的帮助。

徐宇凯¹ 鲁长虎^{2*} 钱锋³ 邓郁⁴

1 江阴市林业指导站 江阴 214400; 2 南京林业大学 南京 210037; 3 张家港东升进出口有限公司 张家港 215600;

4 苏州嘉立文化传播有限公司 张家港 215600

XU Yu-Kai¹ LU Chang-Hu^{2*} QIAN Feng³ DENG Yu⁴

1 Jiangyin Forestry Guidance Station, Jiangyin 214400; 2 Nanjing Forestry University, Nanjing 210037; 3 Zhangjiagang East Rising I/E Co., Ltd., Zhangjiagang 215600; 4 Suzhou Jiali Cultural Communication Co., Ltd., Zhangjiagang 215600, China

* 通信作者, E-mail: luchanghu@njfu.com.cn;

第一作者介绍 徐宇凯, 男, 学士; 研究方向: 林学; E-mail: 271288312@qq.com。

收稿日期: 2024-04-19, 修回日期: 2024-05-29 DOI: 10.13859/j.cjz.202424092 CSTR: 32109.14.cjz.202624092