

介紹几种起鹿和运鹿的方法

張宝蔭 刘振東

(国营黑龙江省玉泉养兽場)

冬季是狩猎和捕鹿的季节，但如何保証捕一只活一只，以各地捕鹿情况来看，确实是一项急待解决的问题。通河县捕了20多只活鹿，由于起鹿和运输不当，結果死了10多只。据不完全统计，全省已捕住的活鹿，由于起鹿不当而死亡的即占30—40%，由于运输不当而死亡的也在20—30%。为了扭转这种现象，提高捕鹿的成活率，現把我省各地較好的起鹿和运鹿方法介紹如下。

一、起鹿方法

(1) 酒醉起鹿法 适用于围栏和地窖。鹿入窖后，即用木杆綁成一个叉字形，把鹿逼在窖壁上并挤牢。然后由另一人用唧筒盛20—30毫升白酒(即半市两左右)，灌入鹿的耳中(因酒能麻醉其中枢神經并醉倒)，趁鹿昏迷不醒时，迅速下窖，将其四蹄捆好，提到窖上。但要注意，在提鹿时不要让鹿仰着翻身，一般过1小时左右便恢复正常，醒后要多加几次清洁的飲水。

(2) 木籠引誘起鹿法 此法适用于围栏和已提前作好木籠引誘起鹿准备的地窖。地窖的准备工作即是，在地窖一边多挖出一个能放木籠的坑道，也盖上盖，作上伪装。当捕到鹿后，将坑道盖打开，把木籠放到坑道里(图1)，将木籠的插門抽开，里面放上飼料，




图1 木籠引誘起鹿法

当鹿餓了看到木籠里有飼料，就会自动进入木籠去吃东西，几天以后，当鹿已熟悉了，就可乘机把木籠插板放下，将它关在木籠里。用这种方法起鹿，不能性急，应慢慢引誘，但关插板时动作要迅速、准确。

(3) 活底木籠罩鹿法 适用于地窖起鹿。用这种

方法起鹿的木籠，必須做得寬大些，其籠底象一个抽匣似的活底(图2)，在起鹿前先搭个木架子，把木籠吊在




图2 活底木籠罩鹿法

窖上边。过几天等鹿对木籠熟悉以后，再进行装。装时一定要等到鹿已走到籠下，看准能罩住时再往下松繩。用此法时，一定要作到稳、准、快，一下把鹿罩在木籠里。然后，下去人把活底插上，在插活底时可用一根长杆子，一边用杆子通鹿腿，一边往里插活底。

(4) 繩索起鹿法 适用于地窖起鹿。繩索起鹿，首先要用較結实的木头搭一个架子，上边安上两个滑車木架的腿用土埋住。然后，准备两条大繩，每根繩的一端各拴上一个鉄环，再制作两根带钩的杆子(图3)。起




图3 繩索起鹿法

鹿时，2人提着繩子，由2人拿着带钩的杆子，用杆子把繩从鹿的腹下掏过来，然后把繩子穿过鉄环，分別把鹿的前胸和后肋套住。用滑車把鹿吊起来，当鹿离地約

有 30 厘米时,可多停一些時間,等鹿老实了再下去人把鹿捆好,将鹿提到窖上。

二、短途运输

(1) 酒醉运鹿法 主要是用酒来麻醉鹿的神經,使其失去知觉,或減輕其兴奋程度,从而保證运输中的安靜。具体作法是,当鹿由地窖中起出或用追捕方法捕到活鹿时,可把鹿綁好,用啣筒盛 20—30 毫升的白酒(即半市两)灌入鹿的耳朵里,这样鹿就会很快的醉得昏昏沉沉,任人摆弄。运输工具最好是用爬犁(夏天可用草爬犁),在爬犁上鋪上草,并做一个草枕头,当鹿抬到爬犁上时,把草枕头垫到鹿的头底下,以免震坏大脑,造成脑淤血等死亡事故。如果路远,可根据酒醉程度,連用几次,一直使其运到目的地,但不能超过两天以上,以防损伤鹿的健康。

(2) 夹杆强迫运输法 由人或套上較温順的牛来操纵夹杆,使鹿在夹杆里不能任意轉动,在人的操纵下,强迫走动。此种运输方式适于运输小鹿和母鹿,对大公鹿则容易发生事故。采用这种方法对道路崎岖难行的山路,比其他运输方法更为优越。具体作法是預备两根长 3.5—4 米的木杆和一些較粗的繩子,当鹿由窖內起出之后,即在鹿体两侧,把两根木杆由前胸、后肋处綁好,并把夹杆在鹿体两侧靠紧,使其不能上下移动,象抬轎子似的,把鹿固定在当中。同时,头上还应拴上籠头,为了避免鹿在掙扎中往前后乱串,可在后臀及前肢处各横两道繩子,前后用人架住夹杆,由人連推带拉,使鹿不由自主的往前走(图 4)。这种运输方法,比較




图 4 夹杆运鹿法

简单易行,效果也很好。但事先必須作好充分准备,严防粗心麻痺,特别是对夹杆要十分注意牢固的程度,以防掙脱和伤人。

(3) 木籠运输法 用一个特制的籠子,将鹿装在里边,用爬犁或胶輪车运,鹿籠的規格可根据鹿的大小,灵活掌握。一般高約 130—170 厘米,寬 60—70 厘米,

长 150—180 厘米,原則上使鹿能臥下,能站起来,而不能轉身。否則,容易使鹿在轉身中夹在籠箱中而不能移动,造成伤亡。制作木籠必須用結实的木材,做得既牢固又輕便,籠箱的底板厚度必須在 3 厘米以上,以防将底板踢坏。底板和距底板 30 厘米高的周围木板要对严,以防鹿腿支出把腿别坏。木籠作成后,要检查一下有无釘帽,以防将鹿体挂伤(见图 5)。为了防止运输




图 5 运鹿木籠

途中把鹿体擦伤,可在木箱內側齐鹿臀部处,用麻袋絮草把木箱板包上。

三、几項注意事項

鹿被捕到后,由于驟然改变环境,加上受惊着急,往往会发生一些急症和由于照管护理不当发生伤亡事故,根据过去的体会主要要注意以下几件事情:

(1) 鼓眼:鹿一受惊着急,常常发生“鼓眼症”,这种病如果治疗不及时,死亡率特別高,急性的 1—2 小时即死。这种病的征候是,眼睛发紅,在白眼球上有許多紅綫,肚子发胀,不爱吃食和喝水。如果治疗及时,这种病好的也很快。治疗方法是,先把鹿綁上,一人使劲抱住鹿脖子,一人用手抓住耳朵,将鹿头固定好,然后用針将眼球上的紅綫挑起,用刀或剪刀割掉,最后用一些食盐或烟面往眼睛里一揉,經過食盐或烟面一杀,流些眼泪就好了。

(2) 在起鹿和运鹿中(短途运输),千万不要飲水,因这时連惊怕带掙扎,飲下水之后往往引起炸肺,而致死。因此,鹿刚捕到和起鹿运输中,最好是喂些草和多汁的块根等飼料,运到目的地后,在冬季应当飲些溫水。

(3) 如果用木箱运时,最好头要朝前,但前边应用麻袋片档上,一是可以阻挡寒风,二是可以与外界隔絕,以免引起惊慌。冬天运输最好是在午間天气暖和点时再运,特别是对用繩綁的酒醉运输,极容易冻坏蹄子(长途运输绝对禁止綁着运)。如果是在夏天,应当赶早晚运,以防中暑。对于起鹿和运输中擦破的外伤,应

趁捆绑的机会进行彻底消毒和治疗，一般治疗方法可用红汞水及酒精消毒，涂上消炎粉，不用包扎，尽量避免多次治疗。

(4) 在起鹿和运鹿中，工作人员一定要安静，千万不要大喊大嚷的恫吓，以及欧打等，这样作不但无效，反而会发生意外事故和给今后驯养带来困难。

(5) 鹿运到目的地时，在头 10—20 天之内，最好先不要喂精料，应多喂些营养丰富及易消化的干草、青贮饲料、豆吻子、干树叶等，在夏天可喂些苜草、青棵大豆、柞、杨、榆、椴等树叶，但不能喂胡桃楸、樱桃树叶，此外也可以喂些白菜、胡萝卜等多汁饲料，同时要多饮水，每次饮水时应加 1—2 钱食盐，以便促进鹿的食欲。