

## 坚持梅花鹿全年放牧

珍贵的梅花鹿,自进入圈养后,逐渐被驯化成为怕人而又近人的状态。通过人工喂养,频繁接触,仍属于胆小易惊的动物。为了更好地驯养,按人们的需要而繁殖发展,提高鹿茸产量,保证供给,支援出口。

无产阶级文化大革命中,我场在各级党委的重视下,积极学习外地经验,试行“人工哺乳驯化仔鹿”,在驯化成功的基础上,利用仔带母,母带公,插群混放的方法,于1967年底将180余只圈养鹿,全部放牧于野外。相继在八年中,调供广东、甘肃及本省九个县放牧鹿600余只。梅花鹿进入全日制放牧后,母鹿受孕,仔鹿成活,公鹿产茸,都相应地有提高。近年来我场即为国家节约粮食二十万斤,减少投资;节约劳力,减轻劳动强度,深受牧工欢迎。

坚持梅花鹿全年放牧,关键是要掌握分娩预兆。否则,在放牧中小羔生于野外,易被狼等野兽伤害;母鹿恋仔,夜不归圈;另一方面,一群母鹿有数十只或几十只,都在外产羔,放牧人员就照顾不过来,若停牧圈养,3人专门割草也满足不了一群鹿的饲量。为了解决在放牧中母鹿的产仔及仔鹿的存活,曾于1971年党支部发动职工,认真总结经验,号召放牧人员,必须掌握母鹿分娩预兆,攻克全年放牧关。

近五年来,我们采取加强母鹿产期管理,正确掌握分娩征兆,从产羔在外极少到1976年小羔全产于圈内,并获得百余只小羔全产全活的优异成绩。

梅花鹿的分娩,用妊娠天数计算分娩时间,只能作为参考,更重要的是观察掌握母鹿分娩征兆。母鹿怀胎后,食欲增加,3、4个月后身体肥胖,在产前一个月左右,胎儿生长发育快,母体腹围增大,行动迟缓,小心谨慎。产前几天乳房显著膨大下垂,摇尾,排尿频频,外阴肿胀以及不合群,在门口徘徊,寻找僻静安全的产仔场所。临产2、3小时,腹窝塌陷,初产母鹿表现不明显。临产时腹疼,低声呻吟,起卧不安,回视腹

## 掌握分娩预兆是关键

部,直到躺卧或站定用力努责,即进入剧烈阵缩期,经过反复几次间歇阵缩之后,胎儿进入阴道,露出胎泡,破水后,胎儿随即产出。在集中用力努责分娩时,如遇惊动,很可能延迟分娩,以致造成难产等不应有的异常现象。

母鹿开始分娩,最初从阴道排出圆球样的水泡,随即破水。正常分娩时间由破水到胎儿落地,快者半小时;慢者3—4小时。分娩时间的长短与母鹿体质、胎儿大小、顺生或倒生、分娩时有无干扰或难产等有关。分娩时,不宜靠近观察,观察时最好不使其发觉。若持续5—6小时不能自娩,表现反常如胎儿两前肢露出,不见头部;或一肢斜出,一肢隐没;或胎儿任何部分都不见,需立即助产。

正确掌握母梅花鹿分娩征状,发现后及时留圈生产,是坚持全年放牧的关键。

放养母梅花鹿妊娠调查表(天)

项 目	全年放牧	仔 鹿 性 别		一胎双羔
		雄	雌	
调查头数	84	43	31	10
平均天数	231	230.6	230.4	234.6
变动范围	222—241	223—241	222—238	227—242

梅花鹿在自然环境里放牧,运动量大,采食自由,食料品种繁多,营养丰富,母鹿受孕及仔鹿成活率都较高,既省工又省料。梅花鹿由圈养改为放牧是养鹿事业的一大革新,是多快好省地发展祖国养鹿事业的新途径,是文化大革命中涌现出来的新生事物。作为我们一个养鹿工作者来讲,对鹿的认识是无止境的,应在实践中不断总结经验,促使我国养鹿事业不断发达兴旺,为社会主义革命和建设作出更大的贡献而努力。

(山西省药物培植场 张子祥、薛正平)