

# 蓝翅八色鸫\*

庞秉璋\*\*

(江苏省太仓县岳王公社卫生院)

蓝翅八色鸫[(东南亚种)*Pitta brachyura nympha*] 较为罕见, 现将野外观察和饲养研究资料整理如下:

**形态** 为中型的鸟类。嘴粗壮, 尖端微弯。翼短带圆, 初级飞羽 10 枚, 最外侧初级飞羽为内侧长度的 4/5, 次级飞羽 8 枚。尾羽 12 枚, 甚短, 呈角尾, 翼覆盖时不易见。跗蹠粗长。外形特征为: 粗嘴、大头、短尾、长脚。

蓝翅八色鸫的羽色美丽, 有红、绿、蓝、白、黑、黄、棕、褐等八色, 故名八色鸫。头棕褐, 中央有黑色冠纹, 眼纹淡黄, 至于枕部。眉斑黑色, 在后头部会合。背浓绿。翼的小复羽、腰、

尾上复羽蓝色。飞羽黑, 中央有白斑。腮喉白。胸淡黄褐。腹近白, 中央朱红色。尾下复羽朱红色。尾黑色, 有蓝色端。喙黑, 基部稍淡。须黑色。虹膜暗褐。跗蹠肉色, 爪黄褐色。雌鸟羽色浅淡。雄鸟嘴较粗, 下嘴黑色深, 雌鸟嘴较细, 下嘴黑色淡。羽毛沾水后, 蓝色部分呈灰色。绿色羽缘带紫红色。鸟腹部及尾上复羽的红色不易淡褪, 1960 至 1964 年的饲鸟, 饲养四年, 红色仍旧鲜艳。测量了两只雄鸟其体长为 195、185 (毫米, 下同), 嘴峰 20、27, 翼 121、

\* 董亲仁同志协助绘图。

\*\* 现已调至上海纺织第二医院。




图1 蓝翅八色鸫的生态

缓,估计时速约为40公里。性喜水浴,水浴姿态与一般雀形目鸟类相似。理羽时简接搔头(鸟类理羽,在头部通常用趾爪抓搔,形式有直接搔头和简接搔头两种,都是一足站立,一足搔头。直接搔头足由腹下直接伸向头部。简接搔头足由腹下经翅腋之间伸向头部。搔头时常用中爪)。有较强的趋光性;易为光线吸引,1969年9月8日一雄鸟,夜间飞入屋内被捕

120,尾35、41,跗蹠37、34。

**迁徙** 据李致勋等<sup>1)</sup>记述,见于上海的日期为5月及10月。我在苏南见到的日期为6月上旬及9月上旬至10月中旬。鉴于往返迁徙,在苏南一带为旅鸟,未见繁殖。几年来野外观察中偶见,数量较少(见表1)。

到。饲养时晚间即使室内有微弱灯光,亦会朝光源移动,遮光后在黑暗中静息。晚间有时栖宿树上。体羽蓝绿及褐黑色,在草丛和枝叶间不易发现。

**鸣声** 多在早晨及黄昏鸣叫,日间少闻。声如“po-po-pi, po-po-pi”,音色似笛。警戒鸣声简单粗大,犹如猫叫,为单声的“gua—”,尾声略带颤音,常重复鸣叫,首次声音较高,以后稍低,每次鸣叫约2秒,远距亦能听到。

**食物** 捕食昆虫及小动物,在野外食蜗牛。饲养实验,食性广泛,所食如下:

无脊椎动物有蛄蛄、蚯蚓、蝇虎、喜蛛;昆虫有油葫芦、蟋蟀、棺头蟋蟀、螽斯、纺织娘、尖头蚱蜢、灰蚱蜢、蟑螂、草螽、金钟儿。伪步行蚱、黄粉蚱及黑粉蚱幼虫、蛹和成虫。大蓑蛾及小蓑蛾的幼虫、葡萄透翅蛾幼虫、小灰蝶。大蚊、细腰蜂等。

其食量较大,饲养中除食生瘦猪肉、鱼肉及蛋黄拌米饭以外,1969年9月27日又食了油葫芦4只,纺织娘2只,尖头蚱蜢4只,蟋蟀7只,草螽1只,棺头蟋蟀1只,大蓑蛾幼虫2只。

表1 八色鸫的野外观察

编号	日期	地点	只数	性别	备注
1	1960年9月18日	上海市郊	单独	♀	捕获饲养
2	1960年10月15日	上海北郊	单独	♂	未获
3	1966年6月3日	吴县横泾	单独	♂	捕获饲养
4	1968年9月7日	上海五角场	单独	♂	捕获饲养
5	1969年9月8日	苏州市区	单独	♂	捕获饲养

**习性** 性孤独隐蔽,多为单只活动。潜居在枝叶茂密的灌林及草丛间,常在地面或以喙掘土觅食。举动敏捷机警。纵跃时缩颈弓背,跃距逾米,常连续急跳。静止时不时伸缩其颈或挺胸伸颈瞭望。兴奋时冠羽松起,两翼不时有瞬息抖动。攻击时两翼向上舒展,引颈而啄。受惊时低头向草丛钻逃。飞时直飞,甚少高飞,常贴地低飞,或边跃边飞,飞时翼上部白斑显著(见图1)。短距离内飞行甚速,长距离飞行较

1) 李致勋等 1959 上海鸟类调查。动物学报 11(3): 390—408。

此鸟啄食蜗牛，实验中食蛭蚰和多种农业害虫，当为益鸟。

中国科学院名词编译局《脊椎动物名称》Pittidae 汉名为八色鸫科，Pitta 为八色鸫属，八色鸫之名系由日名ヤイロテウ(八色鸟)而来。按属内之种，如蓝翅八色鸫有八色外，并非全为八

色，因此一概称为“八色鸫”则名实不切。我认为本科羽色绚丽，不如将 Pittidae 名为丽鸫科，Pitta 名为丽鸫属，应用于属内，则国内所分布的种名可为蓝枕丽鸫，蓝背丽鸫，蓝丽鸫，绿胸丽鸫，栗头丽鸫，似更合适。蓝翅八色鸫可名为蓝翅丽鸫。