

虎 斑 地 鸫

庞 秉 璋

(江苏省太仓县岳王公社卫生院)*

虎斑地鸫 *Zoothera dauma aurea* (Holandre) 比较少见。在苏南称为绣鸫、花鸫(上海), 花鸡、虎鸡(太仓)。现在在上海及太仓两地的野外观察和饲养报道如下。

迁徙 据 1964 年在上海及 1973—1979 年在太仓观察。虎斑地鸫每年春季始见于 4 月上旬, 至 5 月份即不见, 历时短暂, 数量亦少。秋季始见于 9 月下旬, 直至次年 1 月下旬, 历时较长, 数量略多。

习性 体强健, 单独活动, 偶见 2—3 只。苏南一带栖息于丘陵和平原偏僻的茂密灌丛及竹园中, 偶然亦至灌丛和竹园附近的田野, 在地面奔跑窜飞。常在土丘的低凹处、河旁或田沟边泥土潮湿和疏松的地方觅食蚯蚓。啄食时挺身猛啄, 一连数下, 掘松地面, 将蚯蚓拉出, 整条吞食。性机警, 警戒时常立停不动, 挺胸伸颈瞭望。受惊时在林间作短距低空飞行, 一般高约 3 米左右, 窜飞颇速, 每由受惊处飞至林缘或就近另一灌丛或竹园。飞行时因翼下有两条宽阔白斑, 甚易辨识(图 1)。攻击时低头、垂翅、堕尾、松羽, 急行冲击(图 2)。理羽时“筒接搔头”, 足由翅腋间伸向头部搔动。由于体呈橄榄褐色, 入秋以后在枯叶间, 入冬以后在枯草丛中, 不易发现。晚间常栖宿在构及梧桐等阔叶树上。短时期内常活动在固定栖息地, 1976 年冬在太仓农村人家屋后 15 × 5 米的一处小竹园内, 见到两只虎斑地鸫一连两日出没其间, 觅食栖息。

5 个月份)在太仓剖验 23 个鸟胃。其取食频次; 动物性食物为蚯蚓 14 次, 尖头蚱蜢 4 次, 鞘翅目昆虫、金龟蚬幼虫、鳞翅目幼虫各 2 次, 蜗牛、蠹蝮、蚂蚁各 1 次。植物性食物为榉实 2 次, 乌桕子、稗、谷、植物种子各 1 次。可见虎斑地鸫为杂食性鸟, 主以动物为食, 尤嗜蚯蚓。蚯蚓能改良土壤, 对农业有益。但虎斑地鸫在苏南少至农田, 经常是在土丘凹地或竹园、灌丛等非庄稼种植地觅食, 啄食蚯蚓, 对农田庄稼的间接影响不大, 而且还啄食害虫及蜗牛, 益害相较, 对农业仍属有益。

饲养情况下; 食小鱼(圆尾斗鱼, 鳊鱼、圆尾鳊鱼等, 7 厘米以下可整条吞食), 蜚蠊, 灰蚱蜢, 避债蛾幼虫, 灶马, 蜘蛛, 沼虾(能捕捉浅容器水中的活虾), 小河蟹(死蟹, 啄碎后食), 青菜,




图 1 虎斑地鸫翼下白斑示意图



图 2 虎斑地鸫攻击姿态

鸣声 惊叫时声如“ga——”, 响亮而粗涩。或发如吹哨样的“hyo——”长音。啾鸣时声如“hi—hyo—”尖锐的高音。夜间亦鸣叫。

食性 1974—1979 年秋冬(9—12 和 1 月,

* 现已调至上海纺织第二医院。

剥开的桔子,米,饭粒,切碎的生熟猪肝和胃。

狩猎 此鸟体大,重约 150 克,而且肉实味美,苏南猎户在南北迁徙期间均行觅猎。由于

虎斑地鸫数量不多,应加保护。根据食性分析,在 11 月间尚啄食害虫及蜗牛,宜禁猎。