

黑 龙 江 省 的 貂 熊*

徐 学 良

(黑龙江省博物馆)

貂熊 (*Gulo gulo*) 别名狼獾、俗称山狗子。它前肢向后有一圈长毛及蓬松的尾毛，自高处跳下时烈烈飘动，宛如飞翔，故又有“飞熊”之称。现将几年来我馆对貂熊标本的收集、研究和调查访问的资料整理如下。

一、形态概述

貂熊的外形、颜色和大小都和短腿的黑色小家狗相似，但较粗健。貂熊冬毛颜色通身黑褐，夏毛色浅，呈棕红色。体毛长而蓬松，前肢两侧向后绕过臀部，毛长如裙，颜色很淡，夏毛还闪着金黄色。胸前多具白斑，体杂有白色针毛。

貂熊的颅骨很厚实。额区略有升高，鼻骨前端陡然下降，颜面短而阔。矢状嵴很发达，在枕骨上形成很大的突起，向后伸出。标本的外形及头骨量度见表 1。

阴茎骨粗大，末端略弯曲，具丘状突起。基部扩展，呈三边中凹的三角形。直径 3.62 毫米，长 73.74 毫米(见图 1)。

表 1 貂熊的外形及头骨量度

(单位：毫米)

标本号	采集日期	性 别	体重(克)	体长	尾长	耳长	后足长	颅基长	颤宽	上齿列长	眶间宽
654001	1965.4.7	♂	—	760	185	47	170	146.2	103.4	63.3	38.4
731003	1973.2	♂	—	665	205	56	145	140	94.4	57.4	38.9
78001	1978.2.15	♂	7250	690	300	60	166	139.4	94.9	61.2	36.1
356	—	♀	9000	760	185	40	160	135.8	89.5	57.1	37.9

* 本文承中国科学院动物研究所高耀亭同志审阅并提出宝贵意见。文中 356 号标本及龙沙公园的貂熊生殖材料，为黑龙江省自然资源研究所提供。在此一并致谢。




图 1 貂熊的雄性阴茎骨 $\times 2/3$
(依 78001 号标本绘制)

二、生活习性

栖地 貂熊是亚寒带针叶林典型栖息者。通常栖息在森林低地和冻土平原；从山地冻土区直到岩石裸露的山顶；多见于森林沼泽、河

谷、小溪、河的源头。从沼泽地方一直分布到森林草原。也喜欢在林子边缘活动。据猎人讲，在呼玛县十八站附近，见于山区臭松、云杉、冷杉、落叶松及桦树林中。草原、河边较少；在呼玛县北红地方，在植被为落叶松、白桦、水冬瓜、达子香等林相的公路旁见到过。

习性 貂熊多活动于夜间，晨昏尤烈。有时也在白天活动，特别是阴天。在喜桂图旗的乌尔其汉，猎人在晨雾弥漫的早晨，见到貂熊自树上跳下来偷吃獐屁。冬季貂熊到处游荡觅食。一昼夜可行20—45公里。一次可行10—15公里。这一时期个别貂熊的活动范围可达1000平方公里。据十八站鄂伦春猎人讲“貂熊跑的速度不快，骑马可以追上。曾见到貂熊追一只麝，追了九天，才在一个山头上追到”。由于山区食物条件、隐蔽条件都比平原好，所以貂熊在平原比山区活动范围广；貂熊猎食一般采用伏击和追击方式。伏击时常躲在动物经常行走的小路旁或邻近的树上，突然从上面跳下扑向猎物；有时也穷追不舍，一些被追逐的有蹄类动物，由于深雪的阻碍常累得一动也不能动，成为貂熊的猎获物。

貂熊的适应能力很强；能很快的熟悉周围环境；并能根据乌鸦、喜鹊等动物的活动，很快发现动物的尸体。食物不足的时候常常收集动物的尸体，贮存起来；食物丰富的时候会集拢一些貂熊，把食物吃完。食物不足的时候又相互争斗。它的单足迹很像狼，然而，阔得多；足迹链是弯曲的。貂熊的嗅觉很发达。在隐藏有猎物的地方，它会很快的嗅到，且经常从猎人放置的捕兽器中，偷走猎物；也有时进入帐篷偷走猎人的粮食等。

貂熊的臭腺发达；据猎人介绍，当被猎狗追急了的时候，它会放出臭液，再打一个滚，使之遍布全身，此时如果猎狗去咬，就会薰得打喷嚏，貂熊借机逃走。

食性 貂熊吃各种食物。动物性食物中有驯鹿、马鹿、麝、麋、小犴、狐、水獭啮齿类、松鸡、榛鸡及其它动物等。在植物性食物中，吃各种浆果、越桔、岩高兰的果实等，有时也吃松籽、甚

至多孔菌等。在很多地区，貂熊冬季的食物以动物的尸体和其它食肉兽吃剩的食物为主。有人统计，它的食物中，有蹄类占20%以上。1978年2月，我们解剖了一只貂熊的胃，未见食物。

巢穴 貂熊的隐蔽所是洞穴；通常筑在山坡的裂缝中或石头堆中间的空隙里、树根、倒木的下面及空心的树干中。有时也占狐狸、獾、旱獭及其他动物的洞穴。在大兴安岭地区，貂熊有时利用石砬子中的天然洞，洞内并有铺垫物。

繁殖 貂熊大约在秋季的9—10月间交配。幼仔出生在2—4月份。产仔1—5只，通常2—3只。猎人曾在3月份左右，曾在大兴安岭的山洞中捉到过三只貂熊仔。1973年2月在我们解剖的一只雌性貂熊子宫中，发现四枚如鸡卵大小的胎。1979年2月15日齐齐哈尔市龙沙公园，在大兴安岭新捕到的母貂熊，产仔一只，绒毛为灰白色，长约12—13厘米。1980年2月18日该公园又一只雌貂熊，产仔三只。1974年4月末，哈尔滨动物园收购到的幼貂熊，毛色灰褐，近似成兽颜色。据记载，从胎儿产出后的灰白色到近于成兽的灰褐色，大约3—4周的时间。据此分析，大兴安岭北部，貂熊的产仔期约在2月中旬到4月间。幼仔的哺乳期为2.5—3个月。雌雄共同抚育仔兽。仔兽大约二岁性成熟，三岁参加繁殖。

换毛 貂熊一年换毛两次。春季换毛从两侧及后头开始，然后逐渐向后扩展。据调查，大兴安岭北部地区4—5月份换夏毛。10月份长好冬毛。在动物园饲养条件下观察，新生幼仔7月中旬开始换毛，新生毛为深褐色，头部和体侧色淡。换毛从臀部开始，然后到肩部及其他部位，最后为尾部。

饲养 貂熊比较容易饲养，新捕到的貂熊，如果没有严重损伤，一般均能养活；成兽每日给牛肉一公斤左右，分两次喂给。此外，再喂些水果和蔬菜。貂熊幼仔很容易饲养，日粮约为五市两碎牛肉块，分四次喂给；此外，再补充些钙片、鱼肝油、奶、苹果、白菜等，以补充必要的维

生素。以后，日粮随月渐长，喂食次数渐减。

三、分 布

貂熊在我国分布于新疆、内蒙古和黑龙江(以大兴安岭为多)；据1937年—1938年统计东北年产貂熊皮23张。解放以来有据可查的标本约17只。分别采于大兴安岭海拉尔河上游、额尔古纳左旗的敖鲁古雅、阿龙山、开拉气、得耳布尔；鄂伦春自治旗的阿里河、克一克河、甘河；喜桂图旗的乌尔其汉林场、呼玛县十八站等地。

此外，据访问，在加格达奇附近、呼玛县的西林吉、阿穆尔、塔南、都有貂熊的分布。文献记载喜桂图旗的依列克得县志记载、宁安县和

依兰县。

貂熊在我国数量极少，应加强貂熊的生物学特性的研究；注意保护，使这一动物资源迅速发展起来。

参 考 文 献

中国科学院动物研究所兽类组 1958 东北兽类调查报告。45页。科学出版社。

Г. А. Новиков 1956 Хищные млекопитающие СССР Стр. 201—206 Изд. АН. СССР Ленинград.

С. У. Строганов 1962 Звери сибири хищные Стр. 228—242. Изд. АН. СССР Ленинград.

Е. Н. Павловский 1963 Млекопитающие Фауны СССР Стр. 839—841. Изд. АН. СССР Москва. Ленинград.